

くすりのしおり

自己注射剤
2026 年 08 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名: キネレット皮下注 100mg シリンジ

主成分: アナキンラ（遺伝子組換え）(Anakinra(genetical recombination))

剤形: 注射剤

シート記載など:



この薬の作用と効果について

この薬は、インターロイキン 1 (IL-1) (IL-1 α および IL-1 β) という炎症や組織の障害にかかわっている物質に作用し、症状を改善します。

通常、全身型若年性特発性関節炎および成人発症スチル病の治療に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。大腸菌由来のタンパク質に対する過敏症の既往歴、マクロファージ活性化症候群、腎機能障害（透析を受けている方を含む）、感染症またはその疑い、結核またはその既往歴、結核感染の疑い、好中球減少症がある。B 型肝炎ウイルスに感染している、またはその既往歴がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は((: 医療担当者記入))
- ・通常、成人および生後 8 カ月以上で体重 10kg 以上の小児は、体重に応じて以下の量を 1 日 1 回、皮下に注射します。
 - －体重 50kg 以上：1 回 1 シリンジ（主成分として 100mg）
 - －体重 50kg 未満：体重 1kg 当たり 1 回 2mg、なお、16 歳未満の場合、症状に応じて体重 1kg 当たり 1 回 4mg まで増量することがあります。
- ・本剤は 1 シリンジ中に主成分 100mg を含有します。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・一定期間使用したあとで、効果を見ながら使用期間を決めていきます。
- ・前もって医療機関で注射方法について十分なトレーニングを受け、確実に注射できると医師が判断した人のみ自己注射が可能です。使用済みの注射器などを再使用しないこと、使用済みの注射器などすべての器具の廃棄方法などについて説明を受け、その指示に従ってください。
- ・100mg（シリンジ 1 本）未満の用量を使用する場合は、あらかじめシリンジ内の不要な量を廃棄して、シリンジ内に残った必要な量を使用してください。
- ・皮下注射は、腹部、大腿部、上腕部、臀部などに行います。注射するごとに注射部位を変え、同じところに繰り返し注射しないでください。腹部へ注射する場合は、へその周りを避けて注射してください。
- ・皮膚にあざや赤みがある部位、傷や硬くなっている部位、痛みがある部位には注射しないでください。
- ・注射し忘れた場合は、医師または薬剤師に相談してください。決して 2 回分を一度に使用してはいけません。
- ・誤って多く注射した場合は医師や薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、注射するのを止めないでください。

生活上の注意

- ・感染症が発症したり、悪化することがあります。感染症を疑う症状があらわれた場合には、すぐに医師に連絡してください。
- ・この薬を使用する前や使用中は、医師の指示に従って定期的に血液検査や胸部 X 線検査、場合によっては胸部 CT 検査などが行われます。
- ・他院や他科に受診の際は、この薬を使用していることを医師、薬剤師に伝えてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、注射部位反応（紅斑、痛みなど）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・発熱、寒気、体がだるい [重篤な感染症]
- ・発熱、寒気、のどの痛み [好中球減少症]
- ・皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい [薬剤性過敏症症候群]
- ・全身のかゆみ、じんま疹、動悸（どうき）、息苦しい [アナフィラキシー]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、光、凍結を避けて冷蔵庫など（2～8℃）で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄には注意が必要なため受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。
- ・使用済みのシリンジは、専用のごみ箱に入れ、医療機関の指示どおりに廃棄してください。
- ・この薬を使用している間は、生ワクチン〔麻疹（はしか）、風疹（ふうしん）、麻疹・風疹混合（MR）、水痘（みずぼうそう）、おたふくかぜ、BCG など〕の接種はできません。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。